

附件

吉林省新冠肺炎疫情防控常态化消毒 标准指南

所有消毒过程中，均须严格选用合法有效消毒产品，严格按照使用说明书配制、使用和存放，人员频繁流动场所要将消毒产品放置在接触不到的位置，并加强管理。

一、工业企业消毒

工业企业日常环境以清洁为主，消毒为辅。操作台面、桌面、地面，每天用清水或清洁剂擦拭，保持清洁即可。

（一）工业企业要加强室内环境通风，采用自然通风或机械通风方式，每日至少 3 次，每次不少于 30 分钟。

（二）公用场所的环境表面和公共物品表面等，可使用含氯消毒剂、季铵盐类消毒剂或过氧化氢等消毒剂进行预防性消毒。厂房、车间、办公楼内的办公设备、门把手和电梯按钮等高频接触的表面应增加消毒频次，可使用消毒湿巾或酒精擦拭，避免直接用酒精等消毒剂喷洒。

（三）职工用餐可采用分时、错峰、隔座分散就餐或盒饭送餐方式。餐具“一人一用一消毒”，公用餐具清洗后，煮沸或流通蒸汽消毒 15 分钟，或采用热力消毒柜进行消毒。

（四）洗手间要配备足够的洗手液，保证水龙头等供水设施

正常工作。组织职工做好手卫生，及时在流动水下用洗手液或皂液洗手。无洗手条件或无明显污渍时，可用速干手消毒剂，揉搓双手消毒。

二、商贸市场消毒

商场超市和农贸市场监管部门加强日常管理，加强环境卫生整治，加强日常清洁工作。

（一）商场超市：一要加强通风换气，尽可能勤开门窗通风，无开窗条件的，开启空调新风系统强制排风。每天停止营业后，开门窗通风不低于1小时，无开窗条件的，开启空调强排措施，时间不低于15分钟。使用空调系统的，定期请专业机构对送风口等设备和部件进行清洗、消毒。二要在加强日常清洁基础上，对顾客经常接触的门把手、推车、购物篮、电梯扶手、电梯按钮、公共座椅等定时进行擦拭消毒。三要对公用卫生间加大清洁消毒频次，保证流动水洗手设施正常使用，并配备足够的洗手液。

（二）农贸市场：一要加强货品来源的监督管理，严格管理涉疫地区来源货品，尤其做好进口冷链货品的预防性消毒。二要强化日常清洁消毒，做到一日一清洁、一周一大扫除、一月一大清洁。三要督促商户对台面、屠宰工具、砧板用具、笼具等售卖工具，在清洁后进行消毒，同时需对运输工具、档口地面、下水道、墙面、以及畜禽排泄物进行清洁消毒。

三、学校消毒

学校日常以清洁为主，消毒为辅，对师生经常接触的物体表

面可进行预防性消毒。

（一）加强室内自然通风，也可以采用排风扇等机械通风方式，每 2 个小时通风一次，每次 20-30 分钟。

（二）对教室、实验室、图书馆、宿舍、食堂、体育馆、卫生间等公共区域的课桌椅、餐桌椅、台面、教室墙裙、门窗把手、电源开关、宿舍床围栏、楼梯扶手、走廊栏杆、体育器材、水龙头、洗手池等经常接触的部位，使用消毒湿巾或季铵盐类消毒剂进行擦拭消毒，每日 1-2 次。使用含氯消毒剂时，消毒作用到规定时间后，清水擦拭干净。

（三）餐具一人一用一消毒，公用餐具清洗后，煮沸或流通蒸汽消毒 15 分钟，或采用热力消毒柜进行消毒。

（四）生活垃圾应分类管理、收集，及时清运。加强垃圾桶、垃圾箱的清洁，可用消毒剂进行喷洒消毒，每日 1-2 次。

（五）做好手卫生，及时在流动水下用洗手液或皂液洗手。无洗手条件或无明显污渍时，可用速干手消毒剂，揉搓双手消毒。

（六）不应对操场、绿化带、跑道、水池等进行消毒，防止过度消毒对人体造成伤害。

四、机关事业单位消毒

机关事业单位应加强外来人员管理，单位日常环境以清洁为主，消毒为辅，对职工经常接触的物体表面可进行预防性消毒。

（一）会议室、办公室、食堂、卫生间等室内场所要定时通风换气，保持空气流通，通风每日至少 2 次，每次 30 分钟。使用

空调系统的单位，要定期请专业机构对送风口等设备和部件进行清洗、消毒。

（二）单位内部场所及个人办公区域、办公用品，每天用清水或清洁剂擦拭，保持清洁即可。经常接触的电脑、鼠标、电话等表面，可以用酒精湿巾、消毒湿巾擦拭消毒。

（三）公共走廊、楼梯、电梯等公共区域的扶手、门把手、按键和其他公共使用物品要定时进行消毒。

（四）卫生间应保证流动水洗手设施正常使用，并配备足够的洗手液。不具备流动水洗手条件时，应配备方便取用的速干手消毒剂。

（五）每个区域使用的保洁用具要分开，避免混用。洁具污染后应及时消毒，清水漂洗，晾干备用。

（六）往身上喷洒消毒剂、在单位门口放置消毒脚垫都是不科学的消毒方式。

五、街道社区消毒

街道社区应加强日常清洁，保持环境整洁，并做好重点部位预防性消毒。

（一）楼道和电梯：楼道内的扶手、门把手等手经常接触的部位，可用消毒湿巾或浸有消毒液的抹布擦拭消毒，每天 2-4 次。电梯轿厢应加大排风，电梯按键、箱体内部表面等部位也可用上述方法擦拭消毒，每天 2-4 次。

（二）公共健身器材、儿童活动设施：定期对公共健身器材、

儿童活动设施等进行湿性清洁，可使用消毒湿巾或浸有消毒液的抹布擦拭消毒，然后用清水冲洗，并用干净抹布擦去表面残留的消毒剂，每天 1-2 次。

（三）公共卫生间：加大日常清洁频次，每天开窗通风至少 2 次，每次 30 分钟。便器、洗手池可用消毒剂进行擦拭或喷洒消毒，作用 30 分钟后，用清水洗净，每天消毒不少于 2 次。

（四）垃圾存储点：垃圾箱、垃圾桶表面应当每天清洁，可用消毒剂进行擦拭或喷洒消毒，每天 1-2 次。

（五）社区室外环境：社区室外环境不需要大面积消毒，如果局部发生呕吐物或排泄物的污染，可以先清除污染物，然后使用消毒剂进行消毒。

六、居家消毒

居家日常环境以清洁为主，消毒为辅，对经常接触的物体表面可进行预防性消毒。

（一）正常居家环境，家庭成员外出回家以后要及时洗手，没有外人进入，做好通风清洁就可以了。开窗通风每日至少 2 次，每次 30 分钟。

（二）做好手卫生，在流动水下用洗手液或皂液洗手。手部没有明显污渍时，可以选用免洗手消毒剂，揉搓双手 20 至 30 秒做手消毒。

（三）居家的外门把手、屋门把手、手机、遥控器、电器开关、马桶冲水按键等手经常接触的部位要保持清洁，必要时可用

消毒湿巾进行消毒。

（四）电器类消毒时，注意要先断电，完全冷却以后再消毒，否则会有起火爆炸风险。

（五）餐饮具等清洗干净以后，可用清水煮沸消毒十分钟，消毒时需全部浸入水中。

（六）若有疑似病例或确诊病例时，需对其接触环境、物品和分泌物进行随时消毒，送医后，在承担病家消毒任务的相关机构帮助下进行终末消毒。